

Przygotowanie do badania Rezonansem Magnetycznym (MR)

Ważne informacje



Na 3 godziny przed badaniem należy pozostać na czczo (można pić wodę).



Na badanie należy przyjść co najmniej 20 min przed wyznaczoną godziną, w celu wypełnienia ankiety medycznej.



Osoby, które przyjmują na stałe leki powinny je zażyć tak jak zawsze



W czasie trwania badania (20-60 min.) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji



Na badanie należy przyjść w odzieży niezawierającej elementów metalowych (guzików nitów, zapieć, zamków błyskawicznych itp)




W czasie trwania badania (20-60 min.) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji



Wskazane jest zabranie ze sobą cieplejszej odzieży, w pomieszczeniu a aparatem MR jest chłodno (15-20°C)



Przed badaniem należy zdjąć takie przedmioty jak: okulary, biżuteria, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe.



W wypadku badania z środkiem kontrastującym konieczne jest posiadanie wyniku poziomu kreatyniny (nie starsze niż 30 dni, a w przypadku występujących chorób nerek- nie starsze, niż 7 dni)

Przeciwwskazania do badania

Bezwzględnie:




metalowe „magnetyczne” ciała obce w tkankach pacjenta (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miękkich, gałek ocznych; płytki ortopedyczne, itp.), niektóre klamry chirurgiczne, elektrostymulator serca, implanty wewnętrzne, wszczepione pompy insulinowe, klipsy metalowe, ciąża (I trymestr)




Względnie:

ciąża (II i III trymestr) =, „magnetyczne” implanty trwale związane z układem kostnym, rozległe tatuaże w badanej okolicy, klaustrofobia oraz pompa insulinowa, która musi być odłączona na czas badania.

Zalecenia- badania specjalistyczne



W przypadku badania MR głowy należy zmyć makijaż i nie stosować lakieru do włosów. Jeżeli pacjentka posiada makijaż permanentny, powinna o tym poinformować technika obsługującego MR



Badanie MR jamy brzusznej i miednicy.

Dodatkowo na 4 dni przed badaniem należy przejść na dietę lekkostrawną. W dniu badania przyjąć lek Espumisan, a także ziołowe środki przeczyszczające.



Badania MR piersi wykonywane są w 5-12 dniu cyklu. Konieczne jest dostarczenie badania biopsji, badań genetycznych, mammografii - jeżeli były wcześniej wykonane. Nie należy używać antyperspirantów, balsamów, dezodorantów i perfum.

Badanie MR piersi powinno być wykonane 3 miesiące po zakończeniu HTZ (lub antykoncepcji hormonalnej), 6 miesięcy po biopsji gruczołowej piersi oraz 12 miesięcy po zakończeniu radioterapii. Badanie odbywa się w pozycji leżącej na brzuchu.

Trzeba ze sobą zabrać

- Dokument tożsamości
- Skierowanie na badanie (nie jest konieczne w przypadku badań prywatnych).
- Wyniki wcześniejszych badań- płyty i opisy (np. USG, RTG, TK, MR, klisze, wypisy ze szpitala)
- W przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badań. W przypadków stentów, by-pass musi upłynąć 6 tygodni od wszepienia. Mając pewność, że wszczepiony element jest bezpieczny do wykonania badania MR, będzie można wykonać badanie.
- W przypadku badania z środkiem kontrastującym konieczne jest posiadanie wyniku poziomu kreatyniny (nie starsze niż 30 dni, a w przypadku występujących chorób nerek nie starsze, niż 7 dni).

Uwaga



Jeśli podany był kontrast- w okresie 48 godzin po badaniu należy wypić w miarę możliwości więcej płynów obojętnych(1,5-2 litry)

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego, kobieta karmiąca piersią, nie powinna karmić dziecka w ciągu 24 godzin, a ściągnięty w tym czasie pokarm powinien zostać wylany.